



راهنمای تجویز داروی لیپوزومال دوکسوروبیسین

مقاومت درمان

بسمه تعالی

نام دارو	کاربرد خدمت			افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	محل ارائه خدمت	شرط تجویز		تواتر خدمت (تعداد دفعات و فواصل خدمت)	توصیه ها	شرایط تجویز	ملاحظات					
	بستری	سریایی	بستری موقت				اندیکاسیون	کنترا اندیکاسیون									
لیپوزومال دوکسوروبیسین	• متخصص رادیوتراپی-انکولوژی • فوق تخصص خون و سرطان بافتن	• متخصص رادیوتراپی-انکولوژی • فوق تخصص خون و سرطان بافتن	•	•	•	مرکز بستری و سریایی شیمی درمانی	۱- دوکسوروبیسین لیپوزومال فقط در درمان موارد عود کرده و یا مقاوم به درمان لنوم هوچکین قابل تجویز است.	۱- در صورتی که برون ده قلبی (EF) بیش از شروع درمان کمتر از ۵۰ درصد باشد و یا در ازای های حین درمان بیش از ۱۰٪ افت کند، دارو منع مصرف دارد.	۱- رژیم شیمی درمانی دارای دوکسوروبیسین لیپوزومال، در همه موارد تا رسیدن به دوز تجمعی معادل ۲۵۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع از دوکسوروبیسین هیدروکلراید (و ۲۰۰ در موارد ساقه رادیوتراپی میباشند) با بروز عارضه از جمله افت EF به میزان بیش از ۱۰٪ از سطح پایه، قابل تجویز است. ۲- دوز معمول دوکسوروبیسین لیپوزومال، ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم هر ۳ هفته به ازای هر مترمربع بدن است.	۱- جهت تجویز داروی دوکسوروبیسین لیپوزومال، بیمار موظف به ارائه گزارش پاتولوژی مبنی بر ابتلا به یکی از انواع بدخیمی از نوع لنوم هوچکین، سارکوم کاپوزی (Kaposi sarcoma)، لنوم DLBCL، لنوم بورکیت، مولتیپل میلوم، سرطان اپیتلیالی تخمدان (و یا لوله فالوپ و سرطان اولیه پروستات)، سارکوم بافت نرم و لیوموسارکوم رحمی است. ۲- برای اثبات نوع تومور، ممکن است علاوه بر پاتولوژی به موارد زیر نیاز باشد: • مولتیپل میلوم در صورت ایجاد علاقه بر گزارش پاتولوژی، گواهی پزشک درملگر مبنی بر ابتلای بیمار به مولتیپل میلوم • سرطان اولیه پروستات، علاوه بر گزارش پاتولوژی، گواهی پزشک درملگر مبنی بر ابتلای بیمار به سرطان اولیه پروستات • سارکوم بافت نرم در صورت ایجاد علاقه بر گزارش پاتولوژی، گواهی پزشک درملگر مبنی بر ابتلای بیمار به سارکوم بافت نرم ۳- جهت تجویز دوکسوروبیسین لیپوزومال، اثبات وجود موارد زیر بر اساس نوع بیماری نیاز است: • لنوم هوچکین، اثبات بیماری عود کرده و یا مقاوم به درمان به وسیله مدالیته تصویربرداری معتبر و یا پاتولوژی معتبر یا نامه پزشک درملگر • سارکوم کاپوزی (Kaposi sarcoma)، گواهی پزشک درملگر مبنی بر ابتلای بیمار به بیماری گسترده، پیشرونده و علائمدار • لنوم DLBCL، اثبات وجود بیماری عود کرده و یا مقاوم به درمان به وسیله مدالیته تصویربرداری معتبر و یا پاتولوژی معتبر یا نامه پزشک درملگر • لنوم بورکیت، اثبات وجود بیماری عود کرده و یا مقاوم به درمان به وسیله مدالیته تصویربرداری معتبر و یا پاتولوژی معتبر یا نامه پزشک درملگر • مولتیپل میلوم، اثبات وجود بیماری عود کرده و یا مقاوم به درمان به وسیله مدالیته تصویربرداری معتبر و یا پاتولوژی معتبر یا نامه پزشک درملگر • سرطان اپیتلیالی تخمدان (و یا لوله فالوپ و سرطان اولیه پروستات)، - اثبات وجود بیماری مناسبتیک به وسیله مدالیته تصویربرداری معتبر، سونوگرافی و یا پاتولوژی معتبر - برای موارد عود کرده (و نه مناسبتیک) گواهی پزشک درملگر مبنی بر عود بیماری - در صورتی که در مدالیته های تصویربرداری شایعه منفرد مبنی بر مناساز وجود داشته باشد، تایید پاتولوژی • لیوموسارکوم رحمی: - اثبات وجود بیماری مناسبتیک به وسیله مدالیته تصویربرداری معتبر، سونوگرافی و یا پاتولوژی معتبر - برای موارد عود کرده (و نه مناسبتیک) گواهی پزشک درملگر مبنی بر عود بیماری - در صورتی که در مدالیته های تصویربرداری شایعه منفرد مبنی بر مناساز وجود داشته باشد، تایید پاتولوژی ۳- جهت تجویز دوکسوروبیسین لیپوزومال، گواهی پزشک درملگر مبنی بر ابتلا به ساقه صرف انواع دیگر آنتراسکلین، در همه موارد تجمعی دوکسوروبیسین هیدروکلراید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع از سطح بدن در گذشته نیاز است. ۴- جهت تجویز دوکسوروبیسین لیپوزومال، گزارش اکوکاردیوگرافی مبنی بر EF مساوی یا بالای ۵۰ درصد ضروری است (همچنین لازم است عملکرد قلبی به صورت دوره ای بررسی شود و در صورت افت EF بیش از ۱۰٪ از سطح پایه، دارو قطع شود).							
							۲- دوکسوروبیسین لیپوزومال فقط در درمان موارد گسترده، پیشرونده و علائمدار سارکوم کاپوزی قابل تجویز است.	۲- دوکسوروبیسین لیپوزومال در درمان موارد عود کرده و مقاوم به DLBCL قابل تجویز است.			۳- دوکسوروبیسین لیپوزومال در درمان موارد عود کرده و مقاوم به درمان لنوم هوچکین قابل تجویز است.	۳- دوکسوروبیسین لیپوزومال در درمان موارد عود کرده و مقاوم به درمان مولتیپل میلوم قابل تجویز است.	۴- دوکسوروبیسین لیپوزومال در درمان موارد عود کرده و مقاوم به درمان لنوم بورکیت قابل تجویز است.	۵- دوکسوروبیسین لیپوزومال فقط در درمان موارد عود کرده و یا مقاوم به درمان مولتیپل میلوم قابل تجویز است.	۶- دوکسوروبیسین لیپوزومال فقط در موارد عود کرده و یا مناسبتیک سرطان اپیتلیالی تخمدان، لوله فالوپ و سرطان اولیه پروستات، قابل تجویز است.	۷- دوکسوروبیسین لیپوزومال فقط در درمان موارد مناسبتیک با عود کرده سارکوم بافت نرم قابل تجویز است.	۸- دوکسوروبیسین لیپوزومال فقط در درمان موارد مناسبتیک با عود کرده لیوموسارکوم رحم قابل تجویز است.