



قرص پلاویکس چیست؟

همچنین پس از آنژیوپلاستی برای جلوگیری از ایجاد لخته ی مجدد تجویز می گردد.

مشاهده ی مدفوع خونی یا سیاهرنگ

استقرار خون یا سرفه هایی که به همراه دفع خون باشد

بیمارانی که پلاویکس مصرف می کنند باید از نوشیدن الکل جدا خودداری نمایند زیرا الکل می تواند میزان خونریزی از معده و روده را افزایش دهد.



در صورتی که قرار است شما تحت عمل جراحی قرار بگیرید یا قرار است روی دندان های شما عملی انجام گردد، موضوع مصرف پلاویکس را به اطلاع پزشک مربوطه برسانید. زیرا در مواردی لازم است که شما حداقل ۵ روز قبل از انجام اعمال مذکور از مصرف پلاویکس خودداری نمایید تا مانع از خطر افزایش خونریزی غیرقابل کنترل پریدید.

هرگز در زمانی که تحت درمان با پلاویکس هستید، بدون مشورت پزشکتان از داروهای مسکن (داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی) از قبیل ایبوپروفن، دیکلوفناک و فننامیک اسید و ... استفاده نکنید.

قبل از مصرف پلاویکس چه نکاتی را باید به کادر

درمانی خود اظهار کنیم؟؟؟

در صورتی که به پلاویکس آلرژی و حساسیت دارید، یا اگر مبتلا به خونریزی فعال مانند

چه اطلاعاتی را باید در باره ی پلاویکس بدانم؟؟

از آنجایی که پلاویکس مانع ایجاد لخته ی خونی می شود می تواند باعث تشدید خونریزی حتی متعاقب یک آسیب جزئی گردد. بنابراین باید متعاقب بروز خونریزی که متوقف نمی شود، به پزشک خود مراجعه و با او مشورت نمایید.

در موارد زیر فوراً به پزشک خود مراجعه کنید:

هرگاه با خونریزی در یکی از اعضای خود مانند معده و روده روبه رو شدید

پلاویکس یک داروی ضد پلاکتی است که ثابت شده است خطر بروز مجدد سکته ی مغزی و یا حمله ی قلبی را کاهش می دهد.

داروی ضد پلاکتی چیست؟

داروهای ضد پلاکت مانند پلاویکس برای جلوگیری از تشکیل لخته در عروق مصرف می شوند تا خون به راحتی در عروق جریان یافته و اکسیژن به ارگان های حیاتی بدن مانند مغز و قلب برسد.

پزشکان اغلب داروهای ضدپلاکت را برای بیمارانی که در معرض افزایش خطر ابتلا همانند قلبی یا سکته ی مغزی در آینده هستند تجویز می کنند

بیمارستان بین المللی قائم (عج)

پلاویکس



تهیه : بخش آنژیوگرافی

پزشک تایید کننده : دکتر سالاری

تحت نظر کمیته آموزش بیمارستان بین المللی قائم



سلامت شما، تخصص ماست



Ghaem Int Hospital

رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir



خونریزی از زخم معده و یا خونریزی مغزی (ناشی از ضربه ی مغزی) هستید، باید اطلاع دهید.

قبل از مصرف پلاویکس هرگونه حساسیتی که نسبت به دارنوها دارید را به اطلاع پزشک برسانید.

همچنین موارد زیر را به اطلاع پزشک خود

برسانید:

ابتلا به بیماری کلیوی

وجود هرگونه اختلال انعقادی خونی مانند بیماری هموفیلی

سابقه ی سکتة مغزی از قبیل سکتة ی خفیف مغزی ابتلا به زخم معده یا بیماری کولیت السراتیو

ابتلا به بیماری کبدی

در صورت تاکید پزشک بر مصرف داروی پلاویکس از داروهای مشابه (مانند زیلت و اسویکس و ..) استفاده نکنید.

بیمارانی که از ازدیاد ترشح اسید معده رنج می برند می توانند از داروهای مثل رانیتیدین یا سایمتیدین و یا داروی جدید پنتاپرازول استفاده نمایند.