

وارفارین چیست؟

✎ وارفارین دارویی است که پزشک آنرا برای کمتر کردن احتمال لخته شدن خون شما تجویز می‌کند.

✎ دلایل اصلی‌ای که پزشک ممکن است برای شما این داروها تجویز کند، این است که می‌خواهد از تشکیل لخته پیشگیری کرده یا لخته‌ای را که به وجود آمده درمان کند. هیچ چیز نمی‌تواند صددرد جلوی تشکیل لخته را بگیرد، اما درمان ضدانعقادی می‌تواند این خطر را به طرز چشمگیری کاهش دهد. باید در نظر داشت که وارفارین نمی‌تواند لخته شکل گرفته را حل کند، اما از بزرگتر شدن لخته و حرکت کردن آن به نقاط دیگر بدن جلوگیری می‌کند.

بزرگان معمولاً درمان ضدانعقادی را برای بیماران زیر تجویز می‌کنند:

✎ افرادی که از نوعی اختلال در ریتم ضربان قلب به نام فیبریلاسیون دهلیزی در رنج هستند.

✎ بیمارانی که تحت عمل جراحی تعویض مفصل ران یا زانو قرار داشته‌اند.

✎ افرادی که دریچه مصنوعی قلب از نوع فلزی دارند.

بزرگان ممکن است، وارفارین را برای افراد زیر نیز تجویز کنند:

✎ کسانی که سابقه تشکیل لخته در پاها یا ریه‌ها دارند.

✎ افرادی که سابقه سکته مغزی به دنبال ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی دارند.

هدف پزشکان از تجویز وارفارین به این افراد نیز کاهش احتمال بزرگتر شدن لخته یا انتشار آن به سایر نقاط و کاستن از خطر شکل گرفتن لخته‌های جدید است.

در زمان درمان با وارفارین چه کار باید بکنم؟

✎ در صورتی‌که تحت درمان با این دارو قرار دارید، حتماً اقدامات زیر را، به‌ویژه انجام منظم آزمایش خون، جدی بگیرید:

✎ از میزان وارفارینی که باید مصرف کنید، مطلع باشید. شکل قرص‌هایتان را بشناسید و بدانید که چرا پزشک این قرص‌ها را برای شما تجویز کرده است.

✎ قرص‌های وارفارین با قدرتهای مختلفی در بازار وجود دارند که معمولاً با رنگ‌های مختلفی تولید می‌شوند. میزان داروی موجود در هر قرص نیز ممکن است، بر حسب میلی‌گرم روی قرص‌ها یا روی جعبه آنها حک شده باشد. اگر رنگ، شکل یا دوز قرص شما با آنچه که همیشه قبلاً مصرف می‌کرده‌اید تفاوت دارد، حتماً با دکتر داروساز مسئول داروخانه یا پزشک خود در این مورد صحبت کنید.

✎ وارفارین را دقیقاً مطابق دستور پزشک خود استفاده کنید. قرص‌ها را هر روز در یک ساعت مشخص مصرف کرده و هیچ نوبتی را فراموش نکنید. ممکن است پزشک از شما بخواهد روزی که برای انجام آزمایش خون به آزمایشگاه می‌روید، مصرف داروی آن روز را تا گرفتن نتیجه آزمایش به تاخیر بیندازید.

✎ بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را قطع نکرده یا مقدار آنرا کم و زیاد نکنید. همیشه پیش از اینکه داروهایتان کاملاً به اتمام برسد نسبت به تهیه نسخه جدید و خریداری قرص‌ها، حتماً اقدام کنید. در صورتی

✎ از جعبه‌های نگهداری قرص هفتگی استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند که بدانید آیا قرص آن روز خود را خورده‌اید یا نه؟ همچنین چون ممکن است مجبور باشید در روزهای مختلف هفته مقادیر مختلفی از دارو را مصرف کنید، این جعبه‌ها می‌توانند شما را در استفاده صحیح دارویتان کمک کنند. همیشه در اولین روز هفته قرص‌های تمامی روزهای آن هفته را به دقت در محل خود قرار دهید تا بعداً مشکلی در این باره نداشته باشید.

✎ آزمایش خون‌تان را به موقع انجام دهید. وقتی شروع به مصرف وارفارین می‌کنید، پزشک از شما خواهد خواست که در فواصل معین آزمایش انجام داده و وضعیت انعقاد خون خود را کنترل کنید. این آزمایش برای تعیین دوز مناسب دارو برای شما بسیار اهمیت دارد. ممکن است هر هفته یا ماهی یکبار نیاز به انجام این آزمایش داشته باشید. وقتی دوز مناسب دارویتان مشخص شد، احتمالاً فواصل آزمایش‌های خون‌تان بیشتر خواهد شد، مگر اینکه رژیم غذایی‌تان تغییر کرده یا شروع به مصرف داروی جدیدی کنید.

در زمان درمان با وارفارین چه کار باید بکنم؟

✎ حتماً پیش از مصرف هر دارویی با پزشک خود مشورت کنید. بسیاری از داروها روی عملکرد وارفارین تأثیر گذاشته و با آن تداخل دارند، بنابراین حتماً فهرست تمام داروهایی را که مصرف می‌کنید (حتی داروهای بدون نیاز به نسخه یا دانه‌ها، گیاه، مکمل‌ها و

وارفارين



تهیه از
بخش CCU بیمارستان قائم
تأییدکننده و تصویب کننده:
خانم دکتر شیخ الاسلام
زیرنظر:
کمیته آموزشی بیمارستان
قائم (عج)
آخرین بازنگری:
فروردین 1403

❖ ادرار قرمز یا قهوه‌ای تیره، وجود خون در مدفوع یا مدفوع تیره و قیرمانند

❖ درد و تورم شدید پس از یک ضربه، بروز کبودی‌های غیرمعمول بدون علت مشخص یا سابقه ضربه.

همچنین در صورت مشاهده موارد زیر باید با پزشک خود مشورت کنید:

❖ پس از مسواک زدن دچار خونریزی لثه می‌شوید

❖ پس از یک تزریق عادی دچار درد و تورم شدید در محل تزریق می‌شوید

❖ در بیماران مؤنث، خونریزی‌های ماهیانه شدید یا خونریزی غیرعادی در فواصل بین عادات ماهیانه

❖ دچار اسهال و استفراغ شده‌اید یا برای بیش از 24 ساعت نتوانسته‌اید غذا بخورید

❖ تب بالای 38 درجه دارید
❖ به هر دلیل قادر به خوردن قرص وارفارين خود نیستید

❖ دچار تصادف یا حادثه‌ای جدی شده‌اید که می‌تواند سبب خونریزی شدید شود.

چگونه می‌توانم خطر خونریزی را کاهش دهم؟
❖ از مسواک نرم‌تر استفاده کنید.

❖ به جای تیغ برای اصلاح از ریش‌تراش برقی استفاده کنید.

❖ هنگام کار با ابزار تیزی مانند چاقو یا قیچی احتیاط به خرج دهید.

❖ از قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که احتمال زمین خوردن و افتادن در آنها زیاد است، خودداری کنید.

❖ از پرداختن به ورزش‌هایی که خطر آسیب‌دیدگی در آنها زیاد است، پرهیزید.

❖ سعی کنید هر روز مقدار یکسانی ویتامین K دریافت کنید. مقدار ویتامین دریافتی شما، دوز وارفارين مورد نیازتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سبزیجات برگ سبز سرشار از ویتامین K هستند و می‌توانند مانع عملکرد مناسب وارفارين شوند، اما نباید هرگز خود را از مصرف این سبزیجات مفید محروم کنید..

❖ توجه داشته باشید که مصرف همزمان الکل و وارفارين خطر خونریزی را در شما افزایش خواهد داد.

❖ در صورت ابتلا به اسهال، تب، عفونت، ناتوانی در غذا خوردن و هر مشکل دیگر، مسئله را حتماً با پزشک خود در میان بگذارید.

❖ همیشه یک برگه هشدار دهنده که در آن ذکر شده شما وارفارين مصرف می‌کنید و دلیل مصرف این دارو را به همراه داشته باشید و آن را در محلی قرار دهید تا در صورت بروز حادثه یا تصادف، اعضای تیم پزشکی بتوانند به راحتی آن را ببینند و اقدامات لازم را برایتان انجام دهند.

عوارض جانبی وارفارين چه هستند؟

❖ شایع‌ترین عارضه جانبی وارفارين خونریزی است که ممکن است خفیف یا جدی باشد. حتی گاهی از اوقات ممکن است خونریزی درون بدن شما صورت گرفته و قابل مشاهده نباشد.

در صورتی‌که به اشتباه داروی بیشتری مصرف کردید یا هر یک از نشانه‌های احتمالی زیر را داشتید حتماً با پزشک خود تماس بگیرید:

❖ احساس حالت تهوع داشته باشید یا