



تعریف :

به جداسدن جفت از محل اتصالش به دیواره رحم قبل از شروع زایمان جنین دگولمان یا کنده شدن زودرس جفت گویند ، که شیوع آن حدود 1 در 150 زایمان است .

علت شناسی :

- افزایش فشار خون ناشی از حاملگی
- فشار خون مزمن قبل از بارداری
- سابقه کنده شدن جفت در حاملگی قبلی
- پارگی زودرس کیسه آب
- ترومای خارجی (ضربه)
- سیگار کشیدن ، مصرف کوکائین و الکل
- لیومیومهای رحمی
- سن بالای مادر و مولتی پارите (زنی که بیش از یکبار زایمان کرده است)
- اتساع رحمی (حاملگی چند قلویی ، هدرامنیوس
- بند ناف کوتاه
- گروه خونی O مادر

مواد کنده شدن جفت منجر به مرگ جنین در 50 درصد موارد با هیپر تانسیون (افزایش فشار خون) حاملگی همراه هستند

کنده شدن زودرس جفت :

- خونریزی واژینال در 80 درصد موارد
- حساسیت و درد رحمی و درد شکم یا پشت در دو سوم موارد

- زجر جنینی در 60 درصد موارد

- انقباضات غیرطبیعی رحم در 34 درصد موارد .

- زایمان زودرس در 32 درصد موارد

- جنین مرده در 15 درصد موارد

در موارد شدید دگولمان ، احتمال وجود شوک هموولمیک (به خصوص در نوع مخفی) و DIC (اختلالات انعقادی داخل عروقی منتشر) وجود دارد .

افزایش شدت و فرکانس انقباضات رحمی ممکن است از زودرس ترین نشانه های تشخیصی دگولمان باشد .

خونریزی تیره ، گاهی اوقات دفع لخته و همراهی با درد از مشخصات بارز خونریزی واژینال در دگولمان می باشد .

گر زن بارداری در سه ماهه سوم ، ناگهان دچار افت فشار خون ، تکیکاردی (افزایش ضربان قلب) نبض ضعیف و سردی انتها گردد ، بدون اینکه خونریزی خارجی وجود داشته باشد اولین چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد کنده شد زودرس جفت است حال اگر این خانم باردار فشار خون بالا هم باشد وضعیت خطرناکتر خواهد بود به نوسانات کم در حجم خون ، حساسیت نشان می دهد .

انواع کنده شدن زودرس جفت:

1- فرم مخفی : (20 درصد موارد) خونریزی آشکار وجود ندارد و خونریزی در حفره رحم محدود می شود .

کنده شدن جفت ممکن است کامل باشد که عوارض اغلب اوقات شدیداست .

2- فرم آشکار : 80 درصد موارد را تشکیل می دهد که خونریزی آشکار دیده می شود .

کنده شدن جفت اکثر اوقات ناکامل است که عوارض کمتر از شدت کمتریبر خورداراست

گاه در موارد دگولمان ناکامل نیز خونریزی ممکن است مخفی باشد . حدود 30 درصد خونریزیهای سه ماهه سوم ناشی از دگولمان جفت است ؛ که معمولاً بعد از هفته 26 حاملگی ظاهر میشود .



وراهنمای کشوری مامایی بازنگری دوم



بیمارستان قائم (عج)
GHAEM HOSPITAL

کند شدن زودرس

جفت یا دکولمان



تهیه و تنظیم: پرسنل بخش زایمان

پزشک تایید کننده: دکتر مهرافزا

تحت نظر کمیته آموزش بیمارستان قائم

منبع: زنان و زایمان ویلیامز 2014

تشخیص:

- علائم بالینی
- سونوگرافی
- یافته های آزمایشگاهی
- دستورات پزشک:

استراحت نسبی - تا برطرف شدن خونریزی و رفع خطر ناشتا
بمانید

کنترل علائم حیاتی مادر در فواصل زمانی مناسب

چک ضربان قلب جنین و کنترل انقباضات رحمی

انجام آزمایشات - سرم درمانی

چک Cr, BUN, BGRH, HCT, HB, FIBRINOGEN, CBC
bt, ct, Ptt, Pt

رزرو خون در طول اقامت در بیمارستان

(مونیتورینگ ضربان قلب جنین) NST

رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir

کنده شدن جفت یک حادثه اورژانسی است و بیمار هرچه
سریعتر باید در بیمارستان بیشتری شود و در بررسی وضعیت
بیمار کنترل حد رحم و خونریزی و کنترل دقیق علائم حیاتی
از اهمیت بالایی برخوردار است.

عوارض کنده شدن جفت

1- شوک ناشی از خونریزی

2- اختلالات انعقادی و خونریزی غیرقابل کنترل

3- نارسایی کلیه

4- ورود مقادیر زیاد خون به داخل بافت عضلانی رحم و زیر
سرور آن

در مواردیکه جنین زنده ولی دارای زجر جنین باشد
کنده شدن شدید یا پیشرونده جفت محرز باشد و تا زمان
زایمان زمان زیادی لازم است ، سزارین اورژانسی انجام
می شود ولی در مواردیکه دکولمان خفیف و غیر پیشرونده و
جنین مرده باشد زایمان طبیعی اندیکاسیون دارد و باید

تحت مراقبت مستقیم پزشک و اقدامات درمانی برای
پیشگیری از عوارض جبران ناپذیران قرار بگیرد.