

گاستروسکوپی:

گاستروسکوپی یا آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی روشی است برای بررسی لایه های داخلی مری، معده و بخش ابتدایی روده ی باریک. آندوسکوپ یک وسیله ی منعطف و باریک است که قابلیت تصویر برداری دارد. نوک آن وارد دهان می شود و بعد از مری، معده و دوازدهه می گذرد. با استفاده از این روش پزشک می تواند زخم، التهاب، تومور، عفونت و یا خونریزی را مشاهده کند.

با استفاده از این روش نمونه از بافت غیر طبیعی، پولیپ یا جهت بررسی بافت معده از نظر میکروب برداشته می شود. پس از رویت جواب نمونه توسط پزشک روش درمان برای بیمار از جمله برداشتن پولیپ یا از بین بردن میکروب معده صورت می گیرد.

علت آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی:

- یافتن علت استفراغ خونی
- یافتن علت درد شکمی و یا تورم شکم و یا مشکل در بلع، استفراغ و یا کاهش وزن غیر قابل توجیه
- یافتن علت عفونت
- بررسی ترمیم زخم های معده
- بررسی انسداد بین معده و دوازدهه
- بررسی آسیب مری در موارد اورژانسی
- برداشتن پولیپ های مری، معده و یا روده ی کوچک
- علت کم خونی مزمن
- برداشتن جسم خارجی که بلعیده شده
- علت کم خونی مزمن
- برداشتن جسم خارجی بلعیده شده.

آمادگی برای آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی:

پیش از انجام این تست موارد زیر به پزشک اطلاع دهید:


- مصرف هر گونه خواب آور
- مشکلات خونریزی و یا استفاده از داروهای رقیق کننده ی خون مثل وارفارین یا آ ای آ
- مشکلات قلبی
- بارداری
- دیابت و یا استفاده از انسولین
- جراحی و یا درمان با اشعه برای مری، معده و یا بخش بالایی روده ی کوچک
- مشکلات عصبی و کلیوی

از 8 ساعت پیش از انجام این تست از نوشیدن و یا خوردن اجتناب کنید. باید پیش از تست معده خالی باشد. در این حالت احتمال استفراغ کم می شود. اگر فرد استفراغ کند، خطر کمی برای ورود این مواد به ریه ها وجود دارد (به آن آسپیراسیون گویند).



بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج)
Ghaem SubSpecialty Hospital

آندوسکوپی



پزشک تایید کننده: دکتر امین شفارودی

ارتقا سلامت بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج)

آموزش مراقبت های مهم در گاستروسکوپی:

نیم ساعت بعد از انجام گاستروسکوپی و رفع بی حسی می توانید ابتدا مایعات و سپس رژیم نرم میل نمایید.

از سرفه کردن و ریختن خلط خودداری نمایید. در صورت احساس خلط و سرفه مایعات ولرم میل نمایید.

از خوردن غذاهای داغ و سرد خودداری نمایید. داشتن خلط خونی تا 48 ساعت طبیعی است. غذای سنگین و میوه سفت مانند سیب و مصرف نگردد.

رژیم غذایی نرم تا 24 ساعت رعایت گردد.

رشت، بلوار شهید افتخاری

۱۹-۱۱-۱۳۳۳۵۶۵۰

۱۰-۱۳۳۳۵۶۵۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir

خطرات آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی:

عوارض این تست نادر است خطر کمی برای سوراخ شدگی کوچک مری، معده و یا بالای روده ی کوچک وجود دارد.

اگر بیوپسی (نمونه برداری) از دستگاه گوارش گرفته شود ممکن است خونریزی تاجیزی رخ دهد. معمولاً خود به خود این خونریزی قطع می شود.

ضربان قلب نامنظم در زمان این تست ممکن است رخ دهد اگر فرد بیماری قلبی داشته باشد. باید قبل از انجام این تست از پزشک قلب مربوطه دستور انجام آندوسکوپی را به همراه داشته باشد.