


حاملگی خارج از رحم :

تعریف:

جایگزین شدن سلول تخم در هر محل دیگری به جز اندومتر (لایه داخلی رحم) را حاملگی خارج از رحم گویند. حاملگی خارج از رحم بیشتر در لوله های رحمی اتفاق می افتد.

انواع:

جایگزینی ممکن است در قسمت های مختلف صورت گیرد: تخمدان، گردن رحم، لوله رحمی، داخل شکم، حتی جای زخم سزارین قبلی (۸۹ درصد موارد در لوله های رحمی جایگزین می شود).



۲

علامت:

- درد شکم همراه با خونریزی یا لکه بینی
- تاخیر در قاعدگی یا تست حاملگی مثبت
- سبکی سر، سرگیجه
- تهوع، استفراغ
- درد قفسه سینه

تشخیص:

این بیماری به وسیله ی علائم کلینیکی و آزمایش های پاراکلینیکی از قبیل آزمایش خون، تست حاملگی مثبت و انجام سونوگرافی قابل تشخیص می باشد.

درمان :

درمان می تواند به صورت طبی یا انتظار یا طبی انتظاری و یا جراحی باشد.

✓ درمان طبی:

درمان با داروی متوتروکسات بنابه صلاحدید پزشک در موارد خاص شروع خواهد شد.

✓ درمان انتظاری:

این نوع درمان مبتنی بر انجام سونوگرافی و انجام آزمایش بتا ساب یونیت خون با تیتراژ هر ۴۸ ساعت بنابه صلاحدید پزشک معالجتان باشد. در برخی موارد ممکن است حاملگی خارج از رحم بخودی خود جذب شود.

۳


✓ طبی انتظاری:

در این نوع درمان از داروی متوتروکسات برای مددجو استفاده خواهد شد و بنابه صلاحدید پزشک معالج مدتی را در بیمارستان تحت نظر می مانید و سونوگرافی و آزمایش در موعدهای مقرر مشخص شده توسط پزشک معالج برای مددجو انجام خواهد شد. با توجه به جواب سونوگرافی و آزمایش خون، ادامه درمان پیگیری خواهد شد.

✓ جراحی:

در درمان جراحی، با توجه به نوع حاملگی خارج از رحم و صلاحدید پزشک از برش روی شکم (لاپاراتومی) و یا ترجیحاً لاپاراسکوپی استفاده خواهد شد.


نوع درمان بسته به اندازه و محل بارداری خارج از رحم و تمایل شما به مادر شدن مجدد متفاوت است.



۴



بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج)



حاملگی خارج از رحم

منبع: کتاب ویلیامز ۲۰۲۲
گردآوری و تنظیم کننده: پرسنل بخش جراحی زنان (مینا)
تأیید کننده: دکتر مرضیه مهرافزا

تحت نظارت کمیته آموزش بیمارستان فوق تخصصی قائم
(عج)

اجابت مزاج: برای تسهیل در حرکات روده تحرک داشته باشید از غذاهای ملین جهت داشتن اجابت مزاج استفاده کنید. در اکثر موارد داشتن اجابت مزاج نکته ای مهم و قابل اهمیت می باشد.

رسید پاتولوژی: در بیمارستان به شما تحویل داده خواهد شد. در موعد مقرر به بخش پاتولوژی واقع در طبقه زیر همکف مراجعه و جواب آسیب شناسی عمل جراحی خود را دریافت کرده به پزشک معالج نشان دهید
در هنگام ترخیص، زمان ملاقات جدید با پزشک خود را تعیین کنید. نسخه دارویی و درخواست انجام آزمایش و سونوگرافی (در صورت نیاز پزشک معالجتان) را از پزشک دریافت کنید.
۷-۱۰ روز بعد جهت ویزیت به درمانگاه یا مطب پزشکتان مراجعه کنید .

رشت، بلوار شهید افتخاری

۱۹-۱۱-۰۱۳۳۳۵۶۵۰

۱۰-۱۳۳۳۵۶۵۰۰۱

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir

۱۰۱۵@ghaem-hospital.ir

پس از انجام جراحی مراقبت های زیر را رعایت نمایید:

تغذیه: در زمان مشخص شده توسط پزشک معالجتان می توانید مصرف مایعات را شروع کنید (مانند چای شیرین ،آب کمپوت).

تنفس: تمرینات تنفس عمیق و سرفه به گشاد و باز شدن ریه های رو هم خوابیده شما کمک میکند و از عفونت ریه ها پیشگیری می نماید. قبل از انجام سرفه برای ثابت نگه داشتن محل جراحی و پیشگیری از درد می توانید دست خود را روی ناحیه عمل بگذارید سپس سرفه کنید.

فعالیت: پس از خارج کردن سوند ادراری و یا اجازه پزشک معالجتان می توانید اقدام به راه رفتن کنید. زمانی که به شما اجازه داده شد از تخت خارج شوید. ابتدا ۲۰-۱۵ دقیقه بر لبه تخت نشسته و پاها را آویزان کنید در صورتیکه سرگیجه نداشتید با کمک پرستار (برای اولین بار) از تخت خارج شده و راه بروید.

کنترل پانسمان: طبق دستور پزشک معالجتان پانسمان ساده یا ضد آب برای شما استفاده خواهد شد. مراقبت های بعد از آن توسط پرستار و پزشک معالجتان برای شما توضیح داده خواهد شد.

