



سنکوپ وازوواگال چیست ؟

یکی از اعصاب بدن عصب واگ نام دارد که در میان شریان کاروتید چپ و شریان زیر ترقوه ای (ساب کلاوین) چپ وارد قفسه سینه می شود . فعال شدن عصب واگ به کاهش ضربان قلب، افت فشار خون و یا هر دوی اینها منجر می شود. این فعال شدن ممکن است در جریان بیماریهایی مانند التهاب حاد کیسه صفرا، یا در پاسخ به تحریک های دیگر از جمله ماساژ سینوس کاروتید در گردن، مانور والسالوا (حبس کردن نفس و زور زدن)، یا درد به هر علتی مثلا کشیدن خون برای آزمایش یا بعد از عمل جراحی رخ دهد. اگر فعال شدن عصب واگ بیش از حد باشد، بخصوص اگر فرد دچار کم آبی بدن هم باشد فرد غش می کند و به اصطلاح سنکوپ وازوواگال رخ می دهد.

بعد از آنژیو بعضی از بیماران در حین کشیدن

شیت (سوزن داخل کشاله ران) دچار سنکوپ

وازوواگال می گردند



علائم اخطار دهنده

احساس بدحالی و سستی

تنفس سطحی و افت فشار خون

کاهش ضربان قلب و نبض ضعیف

سرگیجه

رنگ پریدگی

پوست سرد و عرق دار

تهوع و استفراغ

گزگز دست و پاها

اختلال بینایی بصورت سیاهی رفتن چشم

احساس صدایی مثل سوت در گوش

از دست دادن تعادل و بیهوش شدن

بدلیلی ترس و اضطراب یا در به هر علتی عصب

واگ تحریک شده که منجر به افت ناگهانی

فشارخون و ضربان قلب گردیده و جریان خون

مغز کاهش پیدا کرده و فرد به طور موقت دچار



کاهش سطح هوشیاری می شود که باید اقدامات لازم صورت گیرد

اقدامات لازم هنگام سنکوپ وازوواگال عبارتند

از :

سرفه و تنفس عمیق

در صورت افت ضربان قلب بلافاصله داروی

افزایش دهنده ضربان قلب (آمپول آتروپین)

تزریق گردد

دادن اکسیژن

کنترل و باز نگه داشتن راههای هوایی در صورت

استفراغ

باز کردن سرم و دادن مایعات وریدی

بلند کردن پاها حدود ۲۰ - ۳۰ سانتی متر

جلوگیری از دفع حرارت بدن با پتو یا لحاف

مانیتورینگ و کنترل علائم حیاتی هر ۵ دقیقه

یکبار سپس گرفتن علائم حیاتی بیمار هر ۱۵ دقیقه

تا ۱ ساعت



سنگوپ وازوواگال

تهیه : بخش آنژیوگرافی

پزشک تایید کننده : دکتر سالاری

تحت نظر کمیته آموزش بیمارستان فوق

تخصصی قائم (عج)



بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) رشت، ارائه خدمات ایمن، اثربخش و بیمار محور
با رعایت استانداردهای متعالی در محیطی زیبا، آرام و دلپذیر را رسالت خود می داند.

رشت، بلوار شهید افتخاری

<https://www.ghaem-hospital.ir>

ghaeminhospital@gmail.com

۰۱۳-۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳-۳۳۵۶۵۰۱۰



در صورت از دست دادن زیاد خون دادن سرم

بعد از بهبودی نسبی دادن مایعات و غذا

آرام کردن محیط

استراحت کردن بیمار



بیمار باید بطور مرتب از نظر فشارخون و ضربان

قلب کنترل گردد