

مراقبت لازم و بهداشت کافی محل

شالدون گذاری

شما بیمار محترم جهت انجام دیالیز نیاز به یک برقراری راه عروقی دارید که در مواقع دیالیز اورژانسی از شالدون استفاده می‌شود و در دیالیز طولانی مدت از وسیله‌ای به نام پرمیکت استفاده می‌شود که شالدون در قسمت ورید و شریان گردن گذاشته می‌شود. (ورید ژوگولار) ولی پرمیکت در قسمت پایین‌تر از گردن (ساب کلاوین) گذاشته می‌شود. ممکن است بعد از مدتی به دلیل عدم رعایت بهداشت ناحیه شالدون یا پرمیکت دچار تب خواهید شد.

وضعیت استراحت و میزان فعالیت

بیمارانی که شالدون و پرمیکت دارند محدودیت در فعالیت ندارند. فقط از کشش و خوابیدن روی موضع باید خودداری نمایند.

رژیم غذایی

رژیم غذایی در این بیماران مانند بیماران دیالیزی می‌باشد کم نمک، کم چرب، کم پروتئین و مایعات با توجه به میزان دفع ادرار مصرف شود.

داروها، مصرف و عوارض داروها

عوارض هشداردهنده داروی مصرفی

در صورت بروز نفس تنگی، راش پوستی، اسهال، سرگیجه و کهیر سریعاً به پزشک اطلاع بدهید.

آگاهی و مراقبت های لازم

بیمارانی که شالدون گذاری با پرمیکت گذاری می‌شوند باید نسبت به عوارض اطلاعات کافی داشته باشند که عبارت از تب به دلیل عفونت، خونریزی، هماتوم، ترشحات چرکی، عدم کارکرد شالدون و یا پرمیکت به دلیل لخته شدن

روش های جایگزین در صورت امکان

تنها روش جایگزین شالدون و پرمیکت، فیستول گذاری می‌باشد که پیوند ورید و شریان است و بیمار برای همیشه از فیستول جهت دیالیز استفاده می‌کند.

کنترل عفونت

رعایت بهداشت ناحیه شالدون و پرمیکت، شستشو و پانسمان روزانه ناحیه شالدون و پرمیکت با بتادین و یا محلول اکتینوسیت، مصرف آنتی‌بیوتیک طبق دستور پزشک، سرلوله نباید باز و در معرض هوا باشد.



رعایت ایمنی بیمار

از خوابیدن روی ناحیه‌ی شالدون و پرمیکت خودداری شود. از ضربه و کشش به شالدون و پرمیکت جلوگیری شود. هنگام لباس پوشیدن مواظب شاخه‌های شالدون و پرمیکت باشید که به لباس گیر نکند و هر دو لاین با یک گاز بسته شود.

آمادگی های قبل از عمل

به بیمار آموزش می‌دهیم که شالدون گذاری یا پرمیکت گذاری تحت بی‌حسی انجام می‌شود و نیاز به ناشتا بودن ندارد و فقط قبل از عمل با آزمایش PT، PTT و HB کنترل شود و رضایت از بیمار گرفته شود.



شالدون



پزشک تأییدکننده: آقای دکتر فیض خواه

تهیه از واحد ارتقا سلامت بیمارستان قائم (عج)

آخرین بازنگری:
خرداد 1403



مراقبت لازم و پانسمان

طرز تمیز نمودن و پانسمان شالدون و پرمیکت با بتادین به طور

عملی به بیمار آموزش داده میشود

و توصیه میشود بعد از پانسمان از سرجی فیکس جهت ثابت

نگاه داشتن پانسمان و هر دو لاین استفاده شود در صورت

تورم، قرمزی، چرک و خونریزی حتما به پزشک اطلاع دهید.

مراقبتهای بعد از شالدون گذاری

❖ پانسمان موضع بعد از هر بار دیالیز و روزانه

❖ جلوگیری از ضربه و کشش روی موضع شالدون یا

❖ پرمیکت

❖ هر دو لاین همیشه توسط هپارین لاک بسته شود

❖ از آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک به طور منظم

استفاده شود

رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir