

هیدروسفالی و مراقبت از شنت گذاری

هیدروسفالی

تجمع CSF به مقدار زیاد در بطنهای مغزی به علت اختلا در جریان یا جذب مایه نخاعی را هیدروسفالی می گویند



انواع هیدروسفالی

ارتباطی: ارتباط مسیر بین محل تولید و جذب مایع مغزی، نخاعی برقرار است ولی جذب مایع در محل پرز های ساب آراگتوئید کاهش یافته و CSF در بطنها تجمع می یابد

غیر ارتباطی: مسیر مجرا از محل تولید تا محل جذب CSF مسدود است

علائم و نشانه ها

- بزرگی جمجمه
- استخوان سر صدای کوزه ترک دارد
- تازگی استخوان سر و برآمدگی آن
- علامت غروب آفتاب (انحراف مردمکها به پایین و خارج)
- تحریک پذیری
- استفراغ و بی اشتها
- سر درد
- اختلال در قوای ذهنی
- خواب الودگی و اغما

رویه تشخیصی

- سی تی اسکن روش انتخابی است
- استفاده از آنسفالوگرافی یاوترکیولوگرافی برای تعیین محل انسداد مایع مغزی نخاعی

انواع درمان

درمان طبی: استفاده از استازولامید جهت تولید مایع نخاعی

درمان جراحی: شنت گذاری

عوارض شنت گذاری

- عفونت
- افزایش درجه حرارت
- قرمزی اطراف محل شنت گذاری

مراقبت پرستاری بعد از عمل جراحی

- وضعیت بعد از شنت گذاری باید به طوری باشد که از تخلیه مناسب شنت جلوگیری نکند
- از ۲۴ دقیقه تا ۱ ساعت بعد از عمل کودک را به طرف غیر عمل قرار داده شود
- تغذیه به مقدار کم و دفعات زیاد
- بعد از ۲۴ ساعت به علت پیشگیری از فشار بر دریچه شنت به پهلوی سالم قرار داده شود
- تغذیه بعد از شنت پر فیبر (آلو، سیب، ریواس) باشد تا از فشار به شنت ناشی از نفخ روده ها و ویبوست جلوگیری شود



هیدروسفالی و مراقبت از شنت گذاری

پزشک تایید کننده: دکتر علیجانی

تحت نظر کمیته آموزشی بیمارستان فوق تخصصی
قائم (عج)



بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) رشت، ارائه خدمات ایمن، اثر بخش و بیمار محور

با رعایت استانداردهای متعالی در محیطی زیبا، آرام و دلپذیر را رسالت خود می داند.

ghaeminhospital



<https://www.ghaem-hospital.ir>



ghaeminhospital@gmail.com



رشت، بلوار شهید افتخاری



۰۱۳-۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹



۰۱۳-۳۳۵۶۵۰۱۰



- قرار دادن سر در امتداد بدن تا از تخلیه سریع جلوگیری شود

آموزش بیمار در منزل

- پانسمان استریل هرروز از محل عمل
- کنترل درجه حرارت
- مصرف مسکن و آنتی بیوتیک
- تجویز شده طبق دستور پزشک
- در صورت بروز تب ولرز، ترشح
- از محل عمل به پزشک معالج خود مراجعه کنید
- از مصرف مواد تحریک کننده (سیگار، عطر، و...) پرهیزید
- روی محل شنت گذاری شده به مدت طولانی ن خوابید
- مراجعه مرتب به پزشک معالج

