


سرکلاژ

یکی از مشکلاتی که برخی از مادران با آن روبرو می شوند، نیاز به عمل سرکلاژ (بستن دهانه رحم) به علت کوتاهی و قیفی شدن دهانه رحم است که قبل و پس آن مراقبت هایی هم لازم است.

تعریف:

به عدم توانایی سرویکس (گردن رحم) در نگهداری یک حاملگی تا زمان ترم "نارسایی سرویکس" گفته می شود. نارسایی سرویکس یکی از عوامل خطر زایمان زودرس است که با اتساع بدون درد سرویکس همراه با بیرون زدگی پرده جنینی به داخل واژن مشخص می شود. درمان جراحی نارسایی سرویکس، سرکلاژ نام دارد. در زنانی که دچار نارسایی دهانه رحم هستند، قسمت انتهایی رحم آنها که به واژن ختم می شود با استفاده از بخیه دوخته می شود تا با بسته شدن دهانه رحم از تولد نوزاد نارس جلوگیری شود.




۲

زمان مناسب:

زمان مناسب برای سرکلاژ 13-16 هفته حاملگی انجام می شود. انجام عمل سرکلاژ پس از هفته 21 بارداری با احتمال عفونت بیشتر و نیز پارگی زودرس کیسه آمنیوتیک همراه است و در شرایط عادی توصیه نمی شود.

موارد مورد استفاده:

- در افرادی که سقط مکرر بدون درد در سه ماهه دوم داشته اند.
- نرم و یا کوتاه بودن طول سرویکس (گردن رحم) گزارش شده در سونوگرافی یا معاینه فیزیکی.
- در افرادی که رحم دو شاخ یا آنومالی های رحمی دارند، نیاز به سرکلاژ بیشتر می باشد.
- در افرادی که دچار پارگی رحم بدنبال زایمان سخت و مشکل شده اند و بهبود نیافته است.
- در بارداری های دوقلو یا سه قلو که احتمال سقط و یا زایمان زودرس بیشتر است.



۳

اقدامات قبل از سرکلاژ:

- انجام سونوگرافی جهت رد ناهنجاری های جنینی و تأیید زنده بودن جنین
- خودداری از نزدیکی یک هفته قبل از عمل



موارد منع انجام سرکلاژ:


- خونریزی واژینال فعال
- انقباضات رحمی
- پارگی پرده های جنینی
- باز شدن بیش از 4 سانتی متر دهانه رحم



۴



بیمارستان قائم (عج) سرکلاژ (دوختن دهانه رحم)



گردآوری و تنظیم کننده: پرسنل بخش جراحی زنان (مینا)

نظارت و تأیید کننده: دکتر مرضیه مهرافرا

بازنگری: فروردین 1403

تحت نظارت کمیته آموزش بیمارستان قائم (عج)

خونریزی:

بعد از سرکلاژ ممکن است کمی خونریزی و لکه بینی ایجاد شود که به تدریج قطع می شود.

در صورت نیاز ممکن است برای شما سونوگرافی درخواست شود که در موعد مقرر انجام دهید.
در هنگام مرخص شدن زمان ملاقات جدید با پزشک خود را تعیین کنید.



نسخه دارویی و نسخه آزمایش یا سونوگرافی (در صورت نیاز و صلاحدید پزشک معالجتان) را از پزشک دریافت کنید.

رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir

مراقبت های پس از عمل سرکلاژ:

تغذیه:

پس از اجازه پزشک معالجتان و در صورت نداشتن تهوع می توانید مصرف مایعات را شروع کنید.

فعالیت:

طبق نظر پزشک معالجتان می توانید فعالیت سبک داشته باشید. نیاز به استراحت مطلق نیست در صورت نیاز به استراحت مطلق از داروهای ضد انعقاد خون برای جلوگیری از عارضه ی خطرناک ترومبوآمبولی باید استفاده شود.

مسکن:

طبق نظر پزشک معالج ممکن است برای شما مسکن نیاز شود که طبق دستور بصورت شیاف یا تزریقی استفاده خواهد شد.

