




تعریف


پایین آوردن بیضه روشی است که در طی آن جراح بیضه نزول نکرده را به داخل کیسه بیضه منتقل می کند
بیضه نزول نکرده شایعترین اختلال سیستم تناسلی مرد است که در نوزادان نارس به نسبت نوزادان رسیده شایعتر میباشد



در اکثر نوزادان طی چند ماه اول بعد از تولد این وضعیت اصلاح میشود و تنها هشت درصد نوزادان پس از سه ماهگی هنوز دچار بیضه نزول نکرده هستند/پزشکان وقتی سن نوزاد بیش از نه ماه باشد و همچنان این وضعیت ادامه داشته باشد اتلاف وقت بیشتر را توصیه نمیکنند چون به ندرت بعد از این سن بیضه ها خود به خود پایین خواهند آمد

تشخیص و درمان


نهان بیضگی معمولاً وقتی که متخصص اطفال نوزاد تازه متولد شده را معاینه میکند تشخیص داده میشود ولی در هر زمان دیگر نیز قبل از بلوغ قابل تشخیص است.
در بیست درصد موارد با لمس و معاینه جایگاه بیضه مشخص نمیشود. جراحی قدم اصلی در جست و جوی بیضه غیر قابل لمس است.



جراح ممکن است از طریق جراحی باز کشاله ران و یا لاپاراسکوپی به جست و جوی بیضه یا بیضه ها بپردازد.
در این موارد پس از پیدا نمودن بیضه طی عمل

جراحی ممکن است به طور مستقیم یا به طور مرحله ای با فاصله شش ماه اقدام به پایین آوردن بیضه شود
پایین آوردن بیضه روشی است که در طی آن جراح با نخ های قابل جذب بیضه نزول نکرده را به داخل کیسه بیضه وصل میکند
بهترین سن جراحی نه تا دوازده ماهگی به صورت سرپایی و بدون بستری میباشد

گاهی پایین آوردن بیضه برای درمان پیچش بیضه انجام میشود این حالت یک اورژانس ارولوژی است که در نتیجه پیچیدن بیضه به دور طناب اسپرماتیک و در نتیجه کاهش خونرسانی ایجاد میشود





مراقبت پس از جراحی:

پیشگیری از عفونت و آموزش به والدین درمورد نحوه مراقبت از کودک در منزل از جمله کنترل درد میباشد

بعد از بیدار شدن و بهوش آمدن تا یک ساعت کودک چیزی نخورد سپس مقدار کمی آب بدهید اگر استفراغ نکرد نیم ساعت بعد میتوانید مایعات را با حجم کم به وی بدهید و در صورت تحمل مایعات میتوانید چند ساعت بعد غذای نرم شروع کنید و از روز بعد عمل غذای عادی شروع کنید

باتمیز نگهداشتن محل جراحی ازادراراز عفونت پیشگیری نمود

24 ساعت بعد از عمل میتوانید پانسمان را بردارید و نیاز به شست و شو با بتادین ندارد

48 ساعت بعد از عمل میتوانید کودک را حمام دهید

بخیه ها نیاز به کشیدن ندارد و خودشان جذب میشوند

در صورت درد میتوانید از استامینوفن هر 6 ساعت یکبار استفاده کنید

در مورد بیمارانی که همزمان ختنه شده اند با دستور پزشک روزی یک یا دو بار محل را با تترتسایکلین یا جنتامیسین چشمی چرب کنید



در صورت مشاهده علایم زیر حتما به پزشک مراجعه کنید

کودک تب دار باشد

ناحیه عمل متورم قرمز رنگ و ملتهب باشد
خونریزی از محل عمل یا ختنه داشته باشد
منبع

پرستاری کودکان ونگ

پرستاری کودکان مارلو

نهان بیضگی



تهیه بخش سوسن

پزشک تایید کننده: دکتر میر جواد

متخصص اطفال و نوزادان

زیر نظر:

کمیته آموزشی بیمارستان قائم (عج)

آخرین بازنگری: فروردین 1403

رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir