

هیپوسپادیاس یک نقص مادرزادی است که در آن دهانه‌ی میزراه به جای اینکه به نوک پنیس (آلت تناسلی مذکر) باز شود، به سطح تحتانی آن باز می‌شود. میزراه لوله‌ای است که از طریق آن ادرار از مثانه خارج شده و به بیرون دفع می‌گردد.

هیپوسپادیاس نقصی شایع است و مشکلی در نگهداری از نوزاد به وجود نمی‌آورد. عمل جراحی معمولاً ظاهر طبیعی را به آلت تناسلی فرزندتان برمی‌گرداند. در صورت درمان موفقیت‌آمیز هیپوسپادیاس، بیشتر افراد می‌توانند دفع ادرار و تولید مثلی عادی داشته‌باشند.

علائم:

در هیپوسپادیاس، دهانه‌ی میزراه به جای نوک پنیس (آلت تناسلی مذکر)، بر سطح تحتانی آن واقع شده‌است. در بیشتر موارد، این دهانه داخل سر آلت قرار دارد. گاهی اوقات هم دهانه‌ی میزراه در وسط یا قاعده‌ی آلت واقع شده‌است. در موارد نادر، دهانه به زیر یا داخل کیسه‌ی بیضه باز می‌شود. نشانه‌ها و علائم هیپوسپادیاس عبارتند:

باز شدن دهانه‌ی میزراه به محلی غیر از نوک آلت تناسلی

• انحنای آلت به سمت پایین (chordee)

• کلاه‌مانند بودن غلغله برای آلت (چون غلغله تنها نیمه‌ی فوقانی آلت تناسلی را می‌پوشاند)

• ریزش غیرطبیعی ادرار هنگام دفع



زمان مراجعه به پزشک

هیپوسپادیاس بیشتر نوزادان، به فاصله‌ی کمی بعد از تولد در بیمارستان تشخیص داده می‌شود؛ البته تشخیصی انحرافات خفیف دهانه‌ی میزراه ممکن است دشوارتر باشد. اگر راجع به ظاهر آلت تناسلی فرزندتان نگرانید یا در دفع ادرار او مشکلاتی وجود دارد، به پزشک مراجعه کنید

علل:

اگرچه علت هیپوسپادیاس معمولاً نامشخص است ولی عوامل زیر ممکن است با آن مرتبط باشند:

- سابقه‌ی فامیلی. وقوع هیپوسپادیاس در نوزادانی که سابقه‌ی فامیلی این نقص را دارند، شایع‌تر است.
- ژنتیک. تنوع‌های ژنتیکی معین می‌توانند سبب اختلال در هورمون‌های محرک تشکیل دستگاه تناسلی مردانه شوند.
- بیشتر بودن سن مادر از ۳۵ سال. بعضی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خطر ابتلا به هیپوسپادیاس در پسر بچه‌هایی که از مادران بالای ۳۵ سال به دنیا می‌آیند، بیشتر است.
- قرارگیری زنان باردار در معرض بعضی از مواد شیمیایی. گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی ارتباط بین هیپوسپادیاس و قرارگیری مادر در معرض هورمون‌ها و مواد شیمیایی خاصی مثل: آفت‌کش‌ها یا مواد شیمیایی صنعتی وجود دارد؛

آموزش مصرف داروها:

توصیه اکید همه پزشکان و منابع درمانی بر پرهیز از تجویز هر گونه داروی ضد اسهال در کودکان و شیرخواران است که می‌تواند خطرناک و منجر به تشدید عواقب بیماری گردد.

مصرف آنتی بیوتیک فقط در اسهال میکروبی مفید است

پس بدون تجویز پزشک به کودکان آنتی بیوتیک ندهید.

آنچه موجب نجات جان کودک شما می‌باشد

پارستان قائم (عج)



هیپوسپادیاس

پزشک تأیید کننده: دکتر میر جواد

تحت نظر کمیته آموزش بیمارستان

قائم (عج)



سلامت شما، تخصص ماست



Ghaem Int Hospital

رشت، بلوار شهید افتخاری

۱۹-۱۱-۰۱۳۳۳۵۶۵۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir



جبران آب و املاح از دست رفته و رعایت
بهداشت برای جلوگیری از سرایت بیماری به
سایرین بخصوص کوچکترهاست.