



برای بچه های بین سه تا چهار ساله، میتوانید از دماسنجهای

دیجیتال به روش مقعدی یا دماسنجهای کترونیکی گوش استفاده کنید. همچنین میتوانید از دماسنجهای دیجیتال به روش زیربغلی استفاده کنید، گرچه دقت کمتری نسبت به سایر روشها دارد.

در موارد زیر با پزشک تماس بگیرید.

در نوشیدن مایعات سرباز میزند و به اندازه کافی مایعات مصرف نمیکند.

دچار اسهال مداوم یا استفراغ شده است.

نشانه هایی از کماب شدن بدن در او مشاهده میشود (کمتر از حد نرمال ادرار دارد، موقع گریه کردن اشک از چشمان او نمی آید، هوشیاری و فعالیت جسمی کمتری نسبت به موقع عادی دارد).

از یک چیز بخصوص شکایت دارد (مثال گلودرد یا گوش درد

هنوز بعد از 24 ساعت (در بچه های زیر 2 سال) یا 72 ساعت (در بچه های بالای 2 سال) قب دارد.

باشد، حتی نوزادانی که زیاد لباس پوشیده‌اند هم باید توسط پزشک معاینه شوند.

و اکسنه: بچه ها و نوزادان گاهی بعد از واکسن دچار قب خفیف میشوند.



نکاتی برای استفاده از دماسنجهای: برای بچه های کمتر از سه ماهه، بهترین و دقیق ترین عدد اندازه گیری با استفاده از دماسنجهای دیجیتال به صورت مقعدی حاصل میشود. دماسنجهای الکترونیکی گوش برای نوزادان کمتر از سه ماهه توصیه نمیشود زیرا کانال گوش آنها معمولاً خیلی کوچک است.

قب در اطفال و نوزادان:

همیشه قب گردن کودک جزو مسایلی است که والدین را دچار استرس می کند. حرارت بدن کودکان در حالت طبیعی بین 8/36 تا 2/37 درجه سانتی گراد در شبانه روز متغیر است. اگر حرارت کودک بیش از این حد باشد، کودک قب دارد.

قب میتواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله:

عفونت: اکثر تبها در اثر یک بیماری یا عفونت خاص در بدن ایجاد میشوند. قب به بدن کمک میکند با تحریک مکانیزمهای دفاعی طبیعی بدن، با عفونتها مقابله کند – **پوشیدن لباس زیاد:** نوزادان، مخصوصاً نوزادان تازه متولدشده، اگر زیاد لباس پیوشنند یا در محلی گرم قرار گیرند، قب میکنند زیرا به اندازه بچه های بزرگتر نمیتوانند درجه حرارت بدن خود را تنظیم کنند. اما از آنجا که قب در نوزادان میتواند نشانه یک عفونت جدی



تب در اطفال و نوزادان



پزشک تایید کننده: دکتر شرفی

تحت نظر کمیته آموزش بیمارستان قائم(عج)

تاریخ بازنگری: فروردین 1400



سلامت شما، تخصص ماست



رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰ ۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰ ۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir



چگونه می توان قب کودک را پایین آورد؟

لباس های کودک را کم کنیم. سعی کنید از لباس های گشاد و نخی استفاده کنید. درجه حرارت اتاق را کم کنید.

تن شویه کردن کودک. آب، قب را زود تر از هوا از بدن دور می کند بنابراین حمام باعث کاهش دما می شود و اثر داروها را بیشتر می کند. از حمام ولرم استفاده کنید اگر دمای آب مقداری کمتر از دمای بدن باشد موجب کاهش قب می شود.

کودک را تشویق به خوردن مایعات کنید. شیر خواران را مرتباً شیر دهید. قب یا عصای کاهش آب بدن می شود بنابراین سعی کنید برای افزایش آب بدن به کودک نوشیدنی بدهید. آب خالص بهترین انتخاب است اما می توان آب میوه رقیق شده نیز به کودک داد. مراقب نشانه های کم آبی بدن مثل ادرار کم، ادرار غلیظ و پررنگ و خشک شدن دهان و لب ها باشید.