

يمكن أن يُسبب الانزلاق الغضروفي ألمًا شديدًا في أحد الطرفين السفليين أو كليهما عند المشى أو الوقوف، وقد يقل الألم إلى حد ما عند الراحة. تُسمى وسائد أو صفائح الغضروف الموجودة في العمود الفقرى أو بين الفقرات القطنية بالأقراص. هذه الأقراص مسؤولة عن امتصاص الصدمات وتقليل الضغط على الحبل الشوكي والأعصاب الطرفية. في الواقع، تمتص هذه الأقراص الضغط الواقع على العمود الفقرى. كما تُساعد هذه الأقراص على تحسين الحركة بين الفقرات. كما تُساعد هذه الأقراص على تحسين الحركة بين الفقرات. وهكذا، اكتشفنا أن جميع البشر مصابون بانزلاق غضروفي قطني، والمقصود بمرض الانزلاق الغضروفي القطني هو في قطني، والمقصود بمرض الانزلاق الغضروفي القطني هو في

## أعراض الانزلاق الغضروفي القطني:


أهم أعراض الألم على طول مسار العصب السنخي. عرق النسا هو عرق نحس في الحقيقة، ولكنه واسع.

ف الواقع، يشير هذا المصطلح إلى ألم يبدأ في الظهر ويمتد كشريط

إلى الجزء الخلفى من الأرداف وخلف إحدى الساقين أو كلتيهما. ومن أسباب هذا الألم، والذى قد يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفى القطنى، اتباع نمط حياة غير صحى، والتقدم فى السن من سن الأربعين فما فوق، بالإضافة إلى فقدان السوائل داخل القرص القطنى. فى هذه الحالة، يفقد القرص مرونته. وفى حالة النشاط البدنى الشاق، أو فى بعض الحالات، يبرز القرص تلقائيًا، مما يؤدى إلى الألم.

يرث بعض الأشخاص هذا المرض من والديهم.

إن الجلوس لفترات طويلة وغير مناسبة، والقيادة لفترات طويلة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية المناسبة، وظروف بيئة العمل غير المناسبة وغير القياسية من بين الأمور التي تسبب إصابات العمود الفقرى لدى البشر اليوم.



## علاج الانزلاق الغضروفي القطني:

لعلاج الانزلاق الغضروفي القطني، يجب عليك الراحة التامة في الأيام القليلة الأولى، وسيوصى طبيبك بالحد الأدنى من الحركة.

لعلاج انزلاق غضروفي قطني، ينبغي استخدام العلاج الدوائي، وهو جزء مهم من العلاج. الأدوية الموصوفة لفتق غضروفي قطني بالغة الأهمية، فبالإضافة إلى السيطرة على الألم، تخفف الالتهاب الموضعي في منطقة القرص والعصب المجاور، مما يُخفف بدوره من ألم المريض. بعد العلاج الأولى والتحسن النسبي في الأعراض، تُستخدم أساليب مثل العلاج الطبيعي والعلاج المائي والتمارين الرياضية لإكمال العلاج ومنع عودة الألم. ملاحظة: تُعتبر الجراحة الملاذ الأخير لفتق غضروفي قطني، حيث إن احتمالية تحسن الحالة بدون جراحة عالية.





الطبيب المُؤكِّد: د. رضا مسخيان

وحدة التثقيف الصحى، مستشفى قائم التخصصى AJ))

تاريخ المراجعة: فروردين ١٤٠٤



سلامت شما، تخصص ماست



- 🧿 رشــت، بلــوار شهيـد افتخــارى
  - o 12220500 1 1 1 9 🙆
  - 0 1 m m m a 5 a 0 1 0 🧶
- www.ghaem-hospital.ir @
- info@ghaem-hospital.ir 🔕

إلا إذا تمزق القرص تمامًا وكان هناك احتمال كبير للشلل في الأطراف السفلية، ففي هذه الحالة يُجرى العلاج الجراحي كحالة طارئة. أما إذا لم يتمزق القرص، فيُنصح بالجراحة في ثلاث

حالات:

الألم شديد جداً ولا يتحسن بالعلاجات الطبية والرياضية. ٢.
الضغط على العصب يُسبب ضعفًا في الساقين ويُقلل من قوتهما.
٣. يُعانى المريض من سلس البول وعدم القدرة على التحكم في التبول والبراز.

## الرعاية بعد جراحة الظهر:

تناول أطعمة غنية بالخضراوات والفواكه الطازجة واللحوم قليلة الدسم ومنتجات الألبان وفيتامين ج، مثل عصائر الفاكهة، بالإضافة إلى الأطعمة الخفيفة والخفيفة. في حال زيادة وزنك، خففه بمساعدة أخصائى تغذية. لا يُنصح بالراحة الطويلة على الإطلاق. تجنب الحركات المفاجئة أو رفع الأشياء الثقيلة.

يُنصح بممارسة تمارين مثل المشى والتمدد والسباحة. كما يُساعد ارتداء أحذية مناسبة، واستخدام مقعد المرحاض وحزام الأمان، والعلاج الطبى على تحسين الحالة الصحية.