


تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۱۱/۰۱	 بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) Chahin Subspecialty Hospital	آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج)	کد سند کد سند ۴۰۲/۰۴/۱۰ مدرك درون سازمانی
محدوده توزیع: کمد مستندات نمونه برداری	شرح کلی: راهنمای آمادگی برای انجام آزمایش‌های انعقادی PT, PTT		تعداد صفحات: ۱ تعداد کپی: ۲

راهنمای آمادگی برای انجام آزمایش‌های انعقادی PT, PTT

آزمایش‌های PT (Prothrombin Time) و PTT (Partial Thromboplastin Time) برای ارزیابی کارایی مسیرهای مختلف سیستم انعقاد خون و همچنین پایش اثربخشی داروهای ضدانعقاد (رقیق‌کننده خون) استفاده می‌شوند.

◆ نکات عمومی و شرایط آمادگی

۱. ناشتایی:

نیازی به ناشتایی برای انجام این آزمایش‌ها وجود ندارد و می‌توانید قبل از نمونه‌گیری غذا میل کنید.

۲. نکات مربوط به داروها (بسیار مهم):

حتماً قبل از مراجعه، با پزشک معالج خود مشورت کنید؛ زیرا قطع یا ادامه مصرف برخی داروها برای تفسیر دقیق نتایج ضروری است.

🔪 تداخلات دارویی (مخصوصاً برای PTT)

از مصرف داروهای زیر حداقل ۲۴ ساعت قبل از آزمایش خودداری کنید، مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد:

- ویتامین C (در دوزهای بالا)
- آنتی‌هیستامین‌ها
- آسپرین
- وارفارین (Coumadin)
- هپارین و سایر داروهای ضدانعقاد جدیدتر

🔪 شرایط نمونه‌گیری در بیماران مصرف‌کننده ضدانعقاد

- برای کنترل دوز وارفارین (تست: PT) نمونه‌گیری باید نیم ساعت قبل از زمان معمول مصرف دوز روزانه وارفارین انجام شود.
- برای کنترل دوز هپارین (تست: PTT) نمونه‌گیری باید نیم ساعت قبل از زمان معمول تزریق یا مصرف دوز روزانه هپارین انجام شود.
- توصیه: برای اطمینان از نتایج قابل مقایسه، توصیه اکید می‌شود که نمونه‌گیری این تست‌ها همیشه در یک آزمایشگاه ثابت انجام شود.