


| | | |
|--|---|---|
| تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۱۱/۰۱ |  بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) Chaharmahal Subspecialty Hospital | کد سند کد سند ۴۰۳/۰۴/۳۲ مدیرک درون سازمانی |
| محدوده توزیع: کمد مستندات نمونه برداری | شرح کلی: راهنمای انجام تست مانتو PPD برای بررسی سل | تعداد صفحات: ۲ تعداد کپی: ۲ |

📌 راهنمای انجام تست مانتو PPD برای بررسی سل

🎯 هدف آزمایش

تست مانتو (Purified Protein Derivative – PPD)، که به تست توپرکولین نیز معروف است، برای تشخیص اینکه آیا فرد در گذشته در معرض باکتری عامل بیماری سل (TB) قرار گرفته است یا خیر، انجام می‌شود. این آزمایش وجود واکنش ایمنی بدن به آنتی‌ژن‌های سل را بررسی می‌کند.

⊗ هشدارهای بسیار مهم (لطفاً با دقت بخوانید)

- **خوانش حیاتی:** این آزمایش یک واکنش پوستی است و خوانش نتیجه آن **100** باید توسط خود فرد در محل تزریق و در بازه زمانی مشخص انجام شود.
- **سوابق مثبت:** اگر در گذشته نتیجه تست PPD شما مثبت شده است، این آزمایش نباید مجدداً انجام شود.
- **نقص ایمنی:** اگر سابقه بیماری عفونی فعال یا نقص سیستم ایمنی دارید، حتماً پیش از تزریق، مسئولین آزمایشگاه را مطلع سازید.
- **واکسن BCG:** اگر در گذشته واکسن BCG (واکسن سل) تزریق کرده‌اید، حتماً زمان آن را به بخش نمونه‌گیری اطلاع دهید.

⌚ زمان بندی دقیق خوانش نتیجه

مهم‌ترین نکته در این تست، زمان بندی است:


- نتیجه تست باید دقیقاً بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از تزریق خوانش شود.
- **31** تطابق با تعطیلات: لطفاً زمان بندی را طوری تنظیم کنید که روز خوانش تست، به روزهای تعطیل رسمی یا آخر هفته تلاقی نکند، زیرا تیم تفسیر در این روزها ممکن است حضور نداشته باشند.
- اگر به هر دلیلی پس از ۷۲ ساعت مراجعه برای شما مقدور نیست، حتماً با پزشک خود تماس گرفته و او را در جریان بگذارید.

📌 مراقبت‌ها تا زمان خوانش (۲۴ تا ۷۲ ساعت)

رعایت این نکات برای جلوگیری از تداخل و تغییر نتیجه ضروری است:

۱. **عدم خیس کردن محل تزریق:** به مدت ۲۴ تا ۷۲ ساعت از خیس شدن، شستن یا استحمام ناحیه تزریق خودداری

نمایید. ❌🚫

| | | |
|--|---|---|
| تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۱۱/۰۱ |  آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) Chahin Subspecialty Hospital | کد سند کد سند ۴۰۳/۰۴/۳۲ ر مدیرک درون سازمانی |
| محدوده توزیع: کمد مستندات نمونه برداری | شرح کلی: راهنمای انجام تست مانتو PPD برای بررسی سل | تعداد صفحات: ۲ تعداد کپی: ۲ |

۲. عدم خاراندن: به هیچ وجه ناحیه تزریق را نخارانید، نمالید یا تحریک نکنید. ✖️👋

۳. اثر خودکار: محلی که تزریق انجام شده، توسط کارمند آزمایشگاه با خودکار علامت گذاری می شود. لطفاً از پاک شدن یا کمرنگ شدن این علامت جلوگیری کنید و در صورت لزوم آن را مجدداً پررنگ نمایید تا محل دقیق قابل شناسایی باشد.



۴. تیمم به جای وضو: در صورت نیاز به طهارت (وضو)، تا زمان خوانش آزمایش، تیمم نمایید. 🧴

📈 واکنش های مورد انتظار پس از تزریق

ممکن است در محل تزریق، واکنش هایی مشاهده شود که طبیعی هستند و نباید موجب نگرانی شوند:

- افزایش ضخامت (تورم) پوست،
- سفتی در ناحیه تزریق،
- قرمزی (اثریتیم) پوست.

این واکنش ها نشان دهنده فعال شدن سیستم ایمنی بدن شما در مواجهه با آنتی ژن سل هستند.

🌟 توصیه پایانی

شما باید خودتان برای بررسی قرمزی و سفتی محل تزریق مراجعه کنید. تفسیر توسط پرسنل مجرب آزمایشگاه انجام خواهد شد.